

Tabela 2. Wartości absorbancji względnej pików w zakresie NIR na różnych głębokościach poziomów organicznych w drzewostanach: bukowym (Bk), świerkowym (Sw), mieszanym (M), dolomitowanym świerkowym (SwD) i dolomitowanym bukowym (BkD). Wartości średnie z pięciu powtórzeń, w nawiasach – wartość odchylenia standardowego

Drzewo- stan	Poziom	Absorbancja względna pików [%]																					
		1440 nm		1680 nm		1740 nm		1920 nm		2060 nm		2140 nm		2170 nm		2270 nm		2320 nm		2360 nm		2390 nm	
Bk	O _i	5	(0,2)	2	(0,1)	5	(0,1)	40	(0,3)	3	(0,3)	5	(0,2)	3	(0,1)	13	(0,3)	13	(0,5)	10	(0,3)	1	(0,2)
	O _f	5	(0,2)	2	(0,1)	5	(0,1)	39	(0,4)	3	(0,1)	4	(0,5)	3	(0,1)	12	(0,7)	15	(1,1)	12	(0,9)	1	(0,4)
	O _h	3	(0,2)	1	(0,3)	5	(0,1)	34	(1,0)	3	(0,1)	3	(0,4)	3	(0,3)	9	(0,9)	20	(1,4)	17	(1,0)	1	(0,4)
	O _h	2	(0,3)	1	(0,2)	5	(0,1)	29	(1,9)	3	(0,2)	3	(0,5)	3	(0,4)	6	(0,8)	25	(1,7)	20	(0,9)	3	(0,6)
Sw	O _i	5	(0,1)	2	(0,1)	5	(0,2)	34	(0,8)	3	(0,1)	5	(0,1)	3	(0,1)	12	(0,1)	17	(0,5)	13	(0,3)	2	(0,2)
	O _f	5	(0,2)	2	(0,2)	5	(0,2)	36	(1,0)	3	(0,1)	4	(0,4)	4	(0,2)	12	(0,4)	16	(1,1)	13	(0,8)	2	(0,2)
	O _f	5	(0,2)	2	(0,1)	4	(0,9)	37	(0,7)	3	(0,1)	4	(0,1)	3	(0,1)	11	(0,3)	17	(0,7)	13	(0,5)	1	(0,2)
	O _h	4	(0,2)	1	(0,1)	5	(0,2)	35	(1,1)	2	(0,1)	4	(0,5)	3	(0,2)	10	(0,5)	19	(0,6)	15	(0,3)	2	(0,2)
	O _h	4	(0,1)	1	(0,1)	5	(0,1)	33	(1,3)	2	(0,3)	4	(0,2)	2	(0,2)	10	(0,5)	21	(0,9)	17	(0,7)	2	(0,4)
	O _h	3	(0,5)	1	(0,2)	5	(0,2)	31	(0,5)	2	(0,2)	3	(0,4)	2	(0,4)	8	(0,8)	24	(1,6)	18	(1,2)	2	(0,3)
M	O _h	2	(0,5)	1	(0,2)	5	(0,1)	32	(0,9)	2	(0,2)	3	(0,5)	2	(0,4)	7	(1,2)	24	(2,0)	19	(1,6)	1	(0,3)
	O _i	5	(0,2)	2	(0,2)	5	(0,1)	37	(1,2)	3	(0,1)	4	(0,2)	3	(0,1)	12	(0,3)	15	(0,9)	12	(0,7)	1	(0,1)
	O _f	4	(0,3)	2	(0,1)	5	(0,1)	36	(1,2)	2	(0,1)	4	(0,2)	3	(0,1)	11	(0,3)	17	(0,7)	14	(0,8)	2	(0,2)
	O _f	4	(0,4)	2	(0,2)	5	(0,1)	36	(1,5)	2	(0,2)	4	(0,2)	3	(0,2)	10	(0,6)	17	(1,2)	15	(1,2)	2	(0,4)
	O _h	3	(0,2)	1	(0,2)	5	(0,1)	36	(0,6)	2	(0,2)	3	(0,2)	3	(0,3)	9	(0,4)	20	(0,3)	16	(0,3)	2	(0,5)
	O _h	3	(0,3)	1	(0,2)	5	(0,2)	33	(0,6)	2	(0,1)	3	(0,2)	2	(0,2)	8	(0,6)	22	(0,6)	19	(0,6)	3	(0,3)
BkD	O _i	5	(0,2)	3	(0,1)	4	(0,2)	43	(0,6)	2	(0,1)	4	(0,1)	4	(0,2)	14	(0,2)	11	(0,3)	9	(0,4)	1	(0,2)
	O _f	4	(0,3)	2	(0,2)	4	(0,1)	40	(0,6)	3	(0,2)	4	(0,3)	3	(0,2)	11	(0,5)	16	(1,1)	13	(0,7)	0	(0,2)
	O _h	4	(0,4)	2	(0,1)	3	(0,5)	39	(1,9)	2	(0,2)	3	(0,1)	3	(0,4)	10	(0,9)	19	(1,4)	15	(1,1)	1	(0,2)
	O _h	3	(0,3)	1	(0,2)	4	(0,7)	33	(2,3)	3	(0,1)	3	(0,4)	3	(0,2)	9	(1,1)	22	(2,0)	19	(1,1)	1	(0,2)
SwD	O _i	6	(0,5)	2	(0,6)	6	(0,5)	37	(2,4)	3	(0,5)	4	(0,4)	3	(0,2)	12	(0,2)	15	(1,7)	11	(1,1)	1	(0,3)
	O _f	5	(0,3)	2	(0,2)	5	(0,2)	37	(2,0)	3	(0,2)	5	(0,3)	3	(0,1)	12	(0,4)	15	(0,9)	13	(0,9)	1	(0,3)
	O _f	4	(0,4)	2	(0,1)	5	(0,1)	35	(0,5)	3	(0,1)	4	(0,3)	3	(0,1)	11	(0,6)	17	(0,9)	15	(0,6)	1	(0,3)
	O _f	4	(0,2)	2	(0,3)	5	(0,2)	35	(1,2)	2	(0,1)	4	(0,4)	3	(0,2)	10	(0,8)	19	(1,4)	15	(0,9)	2	(0,1)
	O _h	4	(0,1)	1	(0,2)	5	(0,1)	33	(0,2)	2	(0,1)	3	(0,2)	2	(0,1)	9	(0,3)	21	(0,4)	17	(0,4)	2	(0,3)
	O _h	3	(0,2)	1	(0,1)	5	(0,2)	31	(0,8)	2	(0,1)	3	(0,3)	2	(0,2)	9	(0,5)	23	(0,5)	18	(0,5)	3	(0,3)